

Hjälpdokument

Kriterer för dissemination i rum (DIR) enligt reviderade McDonaldkriterier 2010 vid skovdebut:

DIR föreligger vid minst en (1) lesion på minst två av fyra MS-typiska lokaler (juxtacortikalt, periventrikulärt, infratentoriellt samt spinalt).

Undantag: Om den symptomgivande lesionen är spinal eller infratentoriell ingår inte dessa för beräkning av DIR
Lesionerna skall vara > 3 mm

Kriterer för dissemination i tid (DIT) enligt reviderade McDonaldkriterier 2010 vid skovdebut:

1. En ny T2 och/eller Gd-laddande lesion(er) på uppföljande MRI i jämförelse med en baseline undersökning, oavsett när baseline MRI-undersökningen är gjord
2. Samtidig förekomst av asymtomatiska Gd-laddande och icke kontrastladdande lesioner *vid vilket tillfälle som helst* ("at any time")

Kriterer för primärprogressiv MS enligt reviderade McDonald 2010 :

1. Ett år av progressiv utveckling av neur symptom, prospektivt eller retrospektivt
2. Plus två av följande tre:
 1. Bevis för DIS i hjärnan genom minst en T2-lesion på två av tre MS-typiska lokaler (jxt cort, periventr, infratent)
 2. Bevis för DIS spinalt genom minst två lesioner i ryggmärgen
 3. Positiv CSF genom OCB eller förhöjt IgG-indexSymptomatiska lesioner i hjärnstam eller spinalt räknas inte in i ovanstående